

婦人科

レジメン名称：CARBO IP

レジメン説明：2015移行により生成
2018/7/10 ウィンドをバック製剤に変更

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	腹腔内注入	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	300mg/m2		301mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:CARBO IP 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		13:30						
02	点滴静注	グレースロン点滴静注バック 3mg/100mL「NK」 療法名:CARBO IP 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg		14:00						
03	腹腔内注入	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 療法名:CARBO IP 腹腔内注入:	0mg		14:30						
04	点滴静注	ウィンド輸液 500mL バック 療法名:CARBO IP 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		15:00 18:00						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ