

婦人科

レジメン名称：NGT + BEV療法

レジメン説明：2017/9/26承認

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハカムチン注射用1.1mg	1.25mg/m2		1.313mg/m2
04	点滴静注	(化)アバースチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:NGT + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:NGT + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
03	点滴静注	(化)ハカムチン注射用1.1mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:NGT + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
04	点滴静注	(化)アバースチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:NGT + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		11:00						
05	点滴静注	生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:NGT + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		12:30	11:00	11:00	11:00	11:00		

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : NGT + BEV療法

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	2回目は60分、3回目以降は30分まで短縮可
05	フラッシュ