

インターバル日数 : 18 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 後)CPT-11 + CDDP プロイメント注

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)トボテシ点静注※	60mg/m2		61mg/m2
05	点滴静注	(化)シスプラチン点静注「マルコ」※	60mg/m2		61mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CPT-11 + CDDP プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:30						
02	点滴静注	プロイメント点静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11 + CDDP プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		11:30						
03	点滴静注	アロキ静注0.75mg 5mL テキアト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11 + CDDP プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		12:00						
04	点滴静注	(化)トボテシ点静注※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:後)CPT-11 + CDDP プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		12:30						
05	点滴静注	(化)シスプラチン点静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:後)CPT-11 + CDDP プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 2時間で	0mg 300mL		14:30						
<次ページあり>											

