

インターバル日数 : 7 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : CDDP併用放射線療法 (Weekly)

レジメン説明 : 2017/5/29 CDDP 30mg/m²で既に登録されていたレジメンだが、ガイドライン等の推奨用量である40mg/m²に用量を引き上げ。それに伴いハイドレーション等も変更。
2018/7/10 ウィンDをバック製剤に変更

適用条件 :

除外条件 : CCr 50mL/min以下の腎機能低下症例には使用しない

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	40mg/m2		42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ウィンD輸液 500mL バック 療法名:CDDP併用放射線療法 (Weekly) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:00						
02	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP併用放射線療法 (Weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 100mL		11:30						
03	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:CDDP併用放射線療法 (Weekly) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		12:00						
04	点滴静注	ウィンD輸液 500mL バック 療法名:CDDP併用放射線療法 (Weekly) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		13:00						
05	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:CDDP併用放射線療法 (Weekly) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		16:00 19:00						

インターバル日数：7日

基準日：Day 1

印刷日時：2020-06-16 09:35:17

最大クール数：0クール

婦人科

レジメン名称：CDDP併用放射線療法(Weekly)

RP	オーダーコメント
04	シスプラチン投与時にはルートキープしておく