

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : CPT-11+NDP療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トホテン点滴静注※	60mg/m2		63mg/m2
04	点滴静注	(化)アクトラ静注用※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:30						
02	点滴静注	グレースロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デキサメタゾン後発)※ 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg		11:30						
03	点滴静注	(化)トホテン点滴静注※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		12:00						
04	点滴静注	(化)アクトラ静注用※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		14:00						
05	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		16:00						
06	点滴静注 <次ページあり>	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」	500mL		19:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : CPT-11+NDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8							
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL									
02	点滴静注	グレースロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デキサメタゾン後発)※ 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg		10:00							
03	点滴静注	(化)トボテン点滴静注※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		10:30							
04	点滴静注	(化)アクトラ静注用※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL									
05	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL									
06	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL									
07	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CPT-11+NDP療法 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:30							

インターバル日数： 21 日

基準日： Day 1

最大クール数： 0クール

共通 レジメン名称： CPT-11+NDP療法

RP	オーダーコメント
07	ルートキープ