

科 人科

レジメン名称 : Pembrolizumab + Lenvatinib併用療法

レジメン説明 : 2022/2/21承認

服用条件 : <レバチブ>

1回20mgを1日1回 連日服用

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|-----------------|----------|-----|-------|
| 02 | 点滴静注 | (化)キイトルーダ 点滴静注※ | 200mg | | 200mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + Lenvatinib併用療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | (化)キイトルーダ 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + Lenvatinib併用療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 50mL | | 投与順 2 | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|---|
| 01 | ルートキープ |
| 02 | インラインフィルター (0.2~5μm) を使用すること 希釈後の濃度が1~10mg/mLとなること |