印刷日時： 2020-05-08 13:48:02

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器

レジメン説明：2018/8/28承認
2019/6/3 nivo→ipiの間の生食に観察期間30分のｺﾒﾝﾄ挿入

適用条件：
除外条件：
体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式 ： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注※	240mg		240mg
05	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	1mg/kg		1.05mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL		投与順 5						

印刷日時： 2020-05-08 13:48:02

インターバル日数： 21 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（1-4回目）泌尿器

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ（ｻﾌﾞﾙｰﾄから他薬剤投与中は中断）
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用
04	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ終了後30分かけて投与（ﾔｰﾎﾞｲ開始までの30分の観察期間用）
05	0.2～1.2μmのフィルター使用
	最終濃度：1～4mg/mL

印刷日時： 2020-05-08 13:48:07

インターバル日数： 14 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（5回目以降）泌尿器

レジメン説明：2018/8/28承認
適用条件：
除外条件：
体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式 ： 男性用:AUC ×（(140-年齢) × 体重 /（72 × CRE) ＋25） 女性用:AUC ×（(140-年齢) × 体重× 0.85 /（72 × CRE) ＋25）
使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注※	240mg		240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（5回目以降）泌尿 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（5回目以降）泌尿 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法（5回目以降）泌尿 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ（ｻﾌﾞﾙｰﾄから他薬剤投与中は中断）
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用

インターバル日数 : 28 日　基準日 : Day 1　最大クール数 : 0クール

泌尿器科　レジメン名称 : 【q4w】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ (5回以降) 泌尿

レジメン説明 : 2020/9/30承認
適用条件 :
除外条件 :
体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)
使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注※	480mg		480mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:【q4w】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ (5回以降) 泌尿 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:【q4w】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ (5回以降) 泌尿 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:【q4w】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ (5回以降) 泌尿 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (ｻﾌﾞﾙｰﾄから他薬剤投与中は中断)
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用