印刷日時： 2020-05-08 14:29:15

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】

レジメン説明：2015移行により生成
2018.5.23　1日1回→投与順へ
2018/7/10 ヴィーンDをバッグ製剤に変更
2019/10/3 【富崎医師】インターバルを21日に変更
2019/11/19 【山崎医師】プレオ皮下注10h→15分divに変更
2020/2/13 メインのヴィーンDがサブの合計時間より短いため修正

適用条件：
除外条件：
体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式　　： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25)　女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)
使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※	20mg/m2		21mg/m2
07	点滴静注	(化)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」 5mL	100mg/m2		105mg/m2
09	点滴静注	(化)ﾌﾞﾚｵ注射用 5mg	30mg		30mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ヴィーンD輸液 500mL バッグ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1		
02	点滴静注	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液 「YD」 300mL 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	150mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3		
04	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 4		
	<次ページあり>										

印刷日時： 2020-05-08 14:29:15

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
05	点滴静注	ヴィーンD輸液 500mL バッグ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 5	投与順 5	投与順 5	投与順 5	投与順 5		
06	点滴静注	20%マンニットール注射液「YD」 300mL 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	150mL		投与順 6	投与順 6	投与順 6	投与順 6	投与順 6		
07	点滴静注	(化)エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 5mL 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 7	投与順 7	投与順 7	投与順 7	投与順 7		
08	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサート注射液(デカドロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 8.25mg 100mL			投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2		
09	点滴静注	(化)ブレオ注射用 5mg 生理食塩液　50mL プラボトル 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL			投与順 8					
10	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL								
	<次ページあり>										

印刷日時： 2020-05-08 14:29:15

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	ヴィーンD輸液 500mL バッグ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
02	点滴静注	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL								
03	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液 「YD」 300mL 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
04	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL								
05	点滴静注	ヴィーンD輸液 500mL バッグ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
06	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液 「YD」 300mL 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
07	点滴静注 ＜次ページあり＞	(化)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」 5mL 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で	0mg 500mL								

印刷日時 : 2020-05-08 14:29:15

インターバル日数 : 21 日　　基準日 : Day 1　　最大クール数 : 0クール

泌尿器科　　レジメン名称 : BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 8.25mg 100mL								
09	点滴静注	(化)ﾌﾞﾚｵ注射用 5mg 生理食塩液　50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL			投与順 2					
10	点滴静注	生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			投与順 1					
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 14:29:15

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16					
01	点滴静注	ヴィーンD輸液 500mL バッグ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
02	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサート注射液(デカドロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL								
03	点滴静注	20%マンニットール注射液 「YD」 300mL 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL								
05	点滴静注	ヴィーンD輸液 500mL バッグ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
06	点滴静注	20%マンニットール注射液 「YD」 300mL 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
07	点滴静注 ＜次ページあり＞	(化)エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 5mL 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で	0mg 500mL								

印刷日時： 2020-05-08 14:29:15

インターバル日数： 21 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16					
		投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 8.25mg 100mL								
09	点滴静注	(化)ﾌﾞﾚｵ注射用 5mg 生理食塩液　50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL			投与順 2					
10	点滴静注	生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:BEP療法　泌尿器科【イメンド内服】 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			投与順 1					

RP	オーダーコメント
10	ルートキープ