

第二外科 レジメン名称 : 後)CBDCA(カルボ) +PTX(パクリ)療法 胸腺癌

レジメン説明 : 2015移行により生成
2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更

適用条件 :
除外条件 :
体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	200mg/m2		210mg/m2
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:後)CBDCA(カルボ)+PTX(パクリ)療法 胸腺癌 点滴静注: *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1						
02	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ ガスター注射液20mg 2mL ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CBDCA(カルボ)+PTX(パクリ)療法 胸腺癌 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 1A 1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:後)CBDCA(カルボ)+PTX(パクリ)療法 胸腺癌 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:後)CBDCA(カルボ)+PTX(パクリ)療法 胸腺癌 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

インターバル日数： 21 日

基準日： Day 1

最大クール数：0クール

第二外科

レジメン名称：後)CBDCA(カルボ) +PTX(パクリ)療法 胸腺癌

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	パクリセル投与前に