

共通

レジメン名称：後)monthly CDDP+VP-16(PE療法)プロイメント注

レジメン説明：2015移行により生成

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)エトホシト点滴静注液100mg「サント」5mL	100mg/m2		110mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		85mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラホトル 療法名：後)monthly CDDP+VP-16(PE療法)プロイメント注 点滴静注： *点滴時間 13時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名：後)monthly CDDP+VP-16(PE療法)プロイメント注 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名：後)monthly CDDP+VP-16(PE療法)プロイメント注 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)monthly CDDP+VP-16(PE療法)プロイメント注 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL テキサート注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)monthly CDDP+VP-16(PE療法)プロイメント注 点滴静注：	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)エトゾシド点滴静注液100mg「サント」5mL 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 6	投与順 3	投与順 3				
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7						
08	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
09	点滴静注	ソルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	ソルデム3A 輸液500mL 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法) フロイメント注 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 1	投与順 1				
12	点滴静注 <次ページあり>	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH	8.25mg 100mL			投与順 2	投与順 2	1回			

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法)ポイント注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法)ポイント注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
13	点滴静注	ルテム3A 輸液500mL 療法名:後)monthly CDDP+VP-16 (PE療法)ポイント注 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 4	投与順 4				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
05	エトポイントの30分前に投与。