

共通 レジメン名称 : 後)monthly CBDCA+VP16療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)エトボシト [®] 点滴静注液100mg「サント [®] 」5mL	100mg/m2		105mg/m2
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント [®] 」※	0mg		1100mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	カルテム3A 輸液500mL 療法名:後)monthly CBDCA+VP16療法 点滴静注: *点滴時間 6.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1				
02	点滴静注	アロキ [®] 静注0.75mg 5mL デキサト [®] 注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)monthly CBDCA+VP16療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)エトボシト [®] 点滴静注液100mg「サント [®] 」5mL 生理食塩液 500mL ソフトバグ [®] 「テルモ」 療法名:後)monthly CBDCA+VP16療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3				
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント [®] 」※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ [®] 「テルモ」 療法名:後)monthly CBDCA+VP16療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキサト [®] 注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)monthly CBDCA+VP16療法 点滴静注: *点滴時間 30分で	9.9mg 100mL			投与順 2	投与順 2				
	<次ページあり>										

