印刷日時： 2020-05-08 13:43:01

インターバル日数： 25 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

共通　　レジメン名称：後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法

レジメン説明：2015移行により生成
適用条件：
除外条件：
体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式　　： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) ＋25)　女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) ＋25)
使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ﾄﾎﾟﾃｼﾝ点滴静注※	60mg/m2		65mg/m2
04	点滴静注	(化)ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液｢ｻﾝﾄﾞ｣※	0mg		1100mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ﾄﾎﾟﾃｼﾝ点滴静注※ ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液200mL 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液｢ｻﾝﾄﾞ｣※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						
	<次ページあり>										

印刷日時： 2020-05-08 13:43:01

インターバル日数： 25 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

共通　　レジメン名称：後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ﾄﾎﾟﾃｼﾝ点滴静注※ ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液200mL 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液｢ｻﾝﾄﾞ｣※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL								
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 13:43:01

インターバル日数： 25 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

共通　　レジメン名称：後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ﾄﾎﾟﾃｼﾝ点滴静注※ ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液200mL 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液｢ｻﾝﾄﾞ｣※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 療法名:後)CBDCA(ｶﾙﾎﾞ)＋weekly CPT-11療法 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL								