

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイット

レジメン説明 : 2019/8/27承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
05	点滴静注	(化)エトボシト点滴静注液100mg「サト」5mL	100mg/m2		105mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		750mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイット 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイット点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイット 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイット 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイット 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)エトボシト点滴静注液100mg「サト」5mL 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイット 点滴静注: <次ページあり>	0mg 500mL		投与順 5	投与順 3	投与順 3				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイト

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3			
		*点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1								
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイト 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6					
07	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイト 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			投与順 1	投与順 1			
08	点滴静注	デキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+VP16療法(二外)プロイト 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3.3mg 100mL			投与順 2	投与順 2			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22μmのフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降は30分に短縮可
07	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Atezolizumab (CBDCA, VP16) 維持 5コース目以降

レジメン説明 : 2019/8/27承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab (CBDCA, VP16) 維持 5コース目以 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab (CBDCA, VP16) 維持 5コース目以 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22μmのフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降は30分に短縮可