

共通

レジメン名称 : 後)AI療法 (ADM+IFM) 【イメド[®]内服】

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| 04 | 点滴静注 | (化)アトリアン注用※ | 30mg/m2 | | 31.5mg/m2 |
| 05 | 点滴静注 | (化)注射用イマテ [®] 1g | 2000mg/m2 | | 2100mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day0 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | |
|----|----------|---|---------------|-------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 01 | 点滴静注 | ソルテ [®] Δ3A 輸液500mL 療法名:後)AI療法 (ADM+IFM) 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴速度 80m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL | | 4回 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカ [®] ロン後発)※ 療法名:後)AI療法 (ADM+IFM) 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 3mg 9.9mg | | | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
| 03 | 緩徐に静注 | ウミテキサン注※ 療法名:後)AI療法 (ADM+IFM) 【イメド [®] 内服】 緩徐に静注: | 0mg | | | 09:30 12:00 16:00 20:00 | 09:30 12:00 16:00 20:00 | 09:30 12:00 16:00 20:00 | 09:30 12:00 16:00 20:00 | 09:30 12:00 16:00 20:00 | |
| 04 | 点滴静注 | (化)アトリアン注用※ 大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:後)AI療法 (ADM+IFM) 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 100mL | | | 09:30 | 09:30 | | | | |
| 05 | 点滴静注 | (化)注射用イマテ [®] 1g 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)AI療法 (ADM+IFM) 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 500mL | | | 11:30 | 11:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 06 | 点滴静注 | ソルテ [®] Δ3A 輸液500mL メイン静注 8.4% 20mL | 500mL 20mL | | | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | |
| | <次ページあり> | | | | | | | | | | |

