

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CMF療法【エンドキサン内服】 2外科

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <エンドキサン (シクロホスファミド) 錠>

★50~200mg/日を1日1~数回に分けて経口投与

★Day1~14内服

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)5-FU注※	500mg/m2		525mg/m2
04	点滴静注	(化)ミトレキート注射液※	40mg/m2		42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	テキサート注射液(テカトロン後発)※ アロキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 1V 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)5-FU注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ミトレキート注射液※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CMF療法【エンドキサン内服】 2外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 1V 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)5-FU注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ミトキサント注射液※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:CMF療法【エンドキサン内服】 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ