

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : docetaxel 3週間毎投与

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23 DOC「EE」へ
 2019/2/25 テキサト16.5mg→6.6mg (LEC) に修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		80mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラホトル 療法名: docetaxel 3週間毎投与 点滴静注: *点滴時間 2.5時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	グレースロン静注液3mg「NK」 3mL テキサト注射液(テキサトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: docetaxel 3週間毎投与 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	3mg 6.6mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名: docetaxel 3週間毎投与 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ