

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)TC (docetaxel+cyclophosphamide)2外科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※	75mg/m2		75mg/m2
04	点滴静注	(化)注射用エンドキサン※	600mg/m2		630mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)TC (docetaxel+cyclophosphamide)2外科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グレセトロン静注液3mg「NK」3mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:後)TC (docetaxel+cyclophosphamide)2外科 点滴静注: *点滴時間 0.5時間で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後)TC (docetaxel+cyclophosphamide)2外科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)注射用エンドキサン※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)TC (docetaxel+cyclophosphamide)2外科 点滴静注: *点滴時間 0.5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキーブ