

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】 Triweekly ハセブチン 2外科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/12/11 メインの生食100mLを追加

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】 Triweekly ハセブチン 2外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:【初回】 Triweekly ハセブチン 2外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 2								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【2回目以降】 Triweekly ハセプ°チン 2外科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/12/11 メインの生食100mLを追加

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセプ°チン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【2回目以降】 Triweekly ハセプ°チン 2外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	(化)ハセプ°チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: 【2回目以降】 Triweekly ハセプ°チン 2外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 2							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ、2回目以降は30まで短縮可