

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 初回)パージェタ+ハーセフン

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL	840mg		840mg
03	点滴静注	(化)ハーセフン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回)パージェタ+ハーセフン 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回)パージェタ+ハーセフン 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ハーセフン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回)パージェタ+ハーセフン 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 2回目以降)パ[°]ジ[°]ェタ+ハセブ[°]チン

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)パ [°] ジ [°] ェタ点滴静注420mg/14mL	420mg		420mg
03	点滴静注	(化)ハセブ [°] チン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:2回目以降)パ [°] ジ [°] ェタ+ハセブ [°] チン 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)パ [°] ジ [°] ェタ点滴静注420mg/14mL 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:2回目以降)パ [°] ジ [°] ェタ+ハセブ [°] チン 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ハセブ [°] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:2回目以降)パ [°] ジ [°] ェタ+ハセブ [°] チン 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	認容性があれば2回目以降30分まで短縮可能
03	認容性があれば2回目以降30分まで短縮可能