

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 初回)パ[°]-ジ[°]ェタ+ハ[°]-セ[°]フ[°]チン+ト[°]セ[°]タ[°]キ[°]セルレジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)パ [°] -ジ [°] ェタ点滴静注420mg/14mL	840mg		840mg
04	点滴静注	(化)ハ [°] -セ [°] フ [°] チン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
06	点滴静注	(化)ト [°] セ [°] タ [°] キ [°] セル点滴静注「EE」※	75mg/m ²		78.75mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回)パ [°] -ジ [°] ェタ+ハ [°] -セ [°] フ [°] チン+ト [°] セ [°] タ [°] キ [°] セル 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	(化)パ [°] -ジ [°] ェタ点滴静注420mg/14mL 生理食塩液 250mL フラボ [°] トル 療法名:初回)パ [°] -ジ [°] ェタ+ハ [°] -セ [°] フ [°] チン+ト [°] セ [°] タ [°] キ [°] セル 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2							
03	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回)パ [°] -ジ [°] ェタ+ハ [°] -セ [°] フ [°] チン+ト [°] セ [°] タ [°] キ [°] セル 点滴静注: *点滴時間 180分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			投与順 1						
04	点滴静注	(化)ハ [°] -セ [°] フ [°] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボ [°] トル 療法名:初回)パ [°] -ジ [°] ェタ+ハ [°] -セ [°] フ [°] チン+ト [°] セ [°] タ [°] キ [°] セル 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			投与順 2						
05	点滴静注	グ [°] ラ [°] ニ [°] セ [°] ト [°] ロン点滴静注ハ [°] ッ [°] グ [°] 3mg/100mL「NK」 テ [°] キ [°] サ [°] ト [°] 注射液(テ [°] カ [°] ト [°] ロン後発)※ ホ [°] ラ [°] ミ [°] ン注 5mg 1ml 療法名:初回)パ [°] -ジ [°] ェタ+ハ [°] -セ [°] フ [°] チン+ト [°] セ [°] タ [°] キ [°] セル 点滴静注: <次ページあり>	3mg 6.6mg 5mg			投与順 3						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 初回)パージェタ+ハーセプチン+トセタセル

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)トセタセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:初回)パージェタ+ハーセプチン+トセタセル 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			投与順 4					

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 2回目以降)パージェタ+ハーセプチン+トセタキセル

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg		420mg
03	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg
05	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	75mg/m2		78.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:2回目以降)パージェタ+ハーセプチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 240分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:2回目以降)パージェタ+ハーセプチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2							
03	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:2回目以降)パージェタ+ハーセプチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3							
04	点滴静注	グラセトン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml 療法名:2回目以降)パージェタ+ハーセプチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg		投与順 4							
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:2回目以降)パージェタ+ハーセプチン+トセタキセル	0mg 250mL		投与順 5							

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 2回目以降)パージェタ+ハーセブチノドセタキセル

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	認容性があれば2回目以降30分まで短縮可能
03	認容性があれば2回目以降30分まで短縮可能