

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】 Triweekly ハセブチン+トセタキセル

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】 Triweekly ハセブチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【初回】 Triweekly ハセブチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml 療法名:【初回】 Triweekly ハセブチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg		投与順 3						
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:【初回】 Triweekly ハセブチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後) 【維持】 Triweekly ハーセフチン+トセタキセル

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセフチン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【維持】 Triweekly ハーセフチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセフチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:後) 【維持】 Triweekly ハーセフチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	グラーセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【維持】 Triweekly ハーセフチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後) 【維持】 Triweekly ハーセフチン+トセタキセル 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ