

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】 w-TPC療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※	4mg/kg		4.2mg/kg
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m ²		84mg/m ²
05	点滴静注	(化)カルボ [®] プラチン点滴静注液「サト [®] 」※	0mg		350mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボ [®] トル 療法名:【初回】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名:【初回】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサ [®] 注射液(デ [®] カ [®] ロン後発)※ ボ [®] ラミン注 5mg 1ml ガ [®] スター注射液20mg 2mL グ [®] ラセトロン点滴静注 [®] ック [®] 3mg/100mL「NK」 療法名:【初回】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 20mg 3mg		投与順 3						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名:【初回】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カルボ [®] プラチン点滴静注液「サト [®] 」※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名:【初回】 w-TPC療法	0mg 250mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】w-TPC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【2回目】 w-TPC療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		2.1mg/kg
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		350mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホファミン注 5mg 1mL ガスター注射液20mg 2mL グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 20mg 3mg		投与順 3						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法	0mg 250mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【2回目】 w-TPC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15							
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL									
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 1							
03	点滴静注	デキサト注射液(デカト後発)※ ホファミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グレセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 20mg 3mg									
04	点滴静注	(化)ハクシケル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 【2回目】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【維持】 w-TPC療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		2.1mg/kg
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		350mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:【維持】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴速度 100ml /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【維持】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:【維持】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 20mg 3mg		投与順 3						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【維持】 w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【維持】 w-TPC療法	0mg 250mL		投与順 5						

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【維持】w-TPC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22							
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:【維持】w-TPC療法 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL									
02	点滴静注	(化)ハセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【維持】w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 1							
03	点滴静注	デキサト注射液(デカト後発)※ ホラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL グラセトロン点滴静注パップ 3mg/100mL「NK」 療法名:【維持】w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 20mg 3mg									
04	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【維持】w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【維持】w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ