

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】3w-TPC療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	4mg/kg		4.2mg/kg
05	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	175mg/m2		183.8mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:【初回】3w-TPC療法 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【初回】3w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】3w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:【初回】3w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 20mg 3mg		投与順 4						
05	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:【初回】3w-TPC療法	0mg 500mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】3w-TPC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 180分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【初回】3w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【2回目】 3w-TPC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【2回目】 3w-TPC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 1						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【維持】3w-TPC療法

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ