

インターバル日数 : 6 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : ハーセプチン+Weeklyワタキソテル (1週目)

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	4mg/kg		4.2mg/kg
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	30mg/m <sup>2</sup>		32mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:ハーセプチン+Weeklyワタキソテル (1週目) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		1回						
02	点滴静注	ソルテ <sup>®</sup> A3A 輸液500mL 療法名:ハーセプチン+Weeklyワタキソテル (1週目) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 1					
03	点滴静注	デキサト注射液(デカト <sup>®</sup> 後発)※ ポラミン注 5mg 1ml ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ハーセプチン+Weeklyワタキソテル (1週目) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 1A 1A 100mL			投与順 2					
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:ハーセプチン+Weeklyワタキソテル (1週目) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			投与順 3					

RP	オーダーコメント
03	タキソテル投与前に

インターバル日数 : 6 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : ハーセプチン+Weeklyワンタキソール (2週目以降)

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		2.1mg/kg
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	30mg/m <sup>2</sup>		32mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	ソルテムA 輸液500mL 療法名:ハーセプチン+Weeklyワンタキソール (2週目以降) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:ハーセプチン+Weeklyワンタキソール (2週目以降) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2								
03	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ハーセプチン+Weeklyワンタキソール (2週目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 1A 0.3mg 100mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:ハーセプチン+Weeklyワンタキソール (2週目以降) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
03	ハーセプチン投与前に