

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : カドサイラ単剤療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)カドサイラ点滴静注用※	3.6mg/kg		3.78mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:カドサイラ単剤療法 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:カドサイラ単剤療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)カドサイラ点滴静注用※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:カドサイラ単剤療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22µmインラインフィルターを通して投与すること 初回90分、問題がなければ2回目以降60分、30分まで短縮可