

共通

レジメン名称 : 後)アムタ+CDDP (フレスミンS注パソビタン必須) NSCLC

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)アムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
08	点滴静注	(化)シプロラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		80mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:後)アムタ+CDDP (フレスミンS注パソビタン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 9時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)アムタ+CDDP (フレスミンS注パソビタン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後)アムタ+CDDP (フレスミンS注パソビタン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイメント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)アムタ+CDDP (フレスミンS注パソビタン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	アロキン静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)アムタ+CDDP (フレスミンS注パソビタン必須) NSCLC 点滴静注:	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ^ンビ^タン必須) NSCLC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ ^ン ビ ^タ ン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 6						
07	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ ^ン ビ ^タ ン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL		投与順 7						
08	点滴静注	(化)シス ^テ ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ ^ン ビ ^タ ン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 8						
09	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ ^ン ビ ^タ ン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルデ ^ム 1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ ^ン ビ ^タ ン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	ソルデ ^ム 1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)アリムタ+CDDP (フレスミンS注パ ^ン ビ ^タ ン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順11						
12	点滴静注 <次ページあり>	デキサ ^ソ ン注射液(デ ^ク カ ^ト ン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH	8.25mg 100mL			1回	1回	1回			

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)アリムタ+CDDP (フルスミンS注パ°ンビ°タン必須) NSCLC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		療法名:後)アリムタ+CDDP (フルスミンS注パ°ンビ°タン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
13	点滴静注	リルテム3A 輸液500mL 療法名:後)アリムタ+CDDP (フルスミンS注パ°ンビ°タン必須) NSCLC 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
05	調製後3時間以内に投与終了すること。
08	アリムタ投与後、30分をあけてCDDPを投与すること。