

## 第二外科

レジメン名称 : PEM + CBDCA + Bevacizumab

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2020/06/30 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m <sup>2</sup>		525mg/m <sup>2</sup>
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※	0mg		1000mg
06	点滴静注	(化)アバスタチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:PEM + CBDCA + Bevacizumab 点滴静注: *点滴時間 240分で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + Bevacizumab 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサート注射液(デキサメタゾン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + Bevacizumab 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + Bevacizumab 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:PEM + CBDCA + Bevacizumab	0mg 250mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : PEM + CBDCA + Bevacizumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)アバスタン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + Bevacizumab 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
06	忍容性良ければ2回目60分、それ以降30分まで短縮可。