

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : PEM+BEV (フルスミンS、パニヒタン内服必須)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m <sup>2</sup>		525mg/m <sup>2</sup>
04	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM+BEV (フルスミンS、パニヒタン内服必須) 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM+BEV (フルスミンS、パニヒタン内服必須) 点滴静注: *点滴時間 20分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM+BEV (フルスミンS、パニヒタン内服必須) 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM+BEV (フルスミンS、パニヒタン内服必須) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	初回90分、次回から60~90分で