

第二外科

レジメン名称 : 後)シス^プラチン+ト^セタキセル 肺癌【^フロイメント^注】

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)ト ^セ タキセル点滴静注「EE」※	60mg/m2		63mg/m2
07	点滴静注	(化)シス ^プ ラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ^フ ラボ ^{トル} 療法名:後)シス ^プ ラチン+ト ^セ タキセル 肺癌【 ^フ ロイメント ^注 】 点滴静注: *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテ ^ム 1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)シス ^プ ラチン+ト ^セ タキセル 肺癌【 ^フ ロイメント ^注 】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテ ^ム 1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後)シス ^プ ラチン+ト ^セ タキセル 肺癌【 ^フ ロイメント ^注 】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	^フ ロイメント ^注 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)シス ^プ ラチン+ト ^セ タキセル 肺癌【 ^フ ロイメント ^注 】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	^ア ロキ ^ン 静注0.75mg 5mL ^テ キ ^サ ト注射液(^テ カ ^ト ン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)シス ^プ ラチン+ト ^セ タキセル 肺癌【 ^フ ロイメント ^注 】	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						
<次ページあり>											

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)シス[°]ラチン+ト[°]セタキセル 肺癌【[°]ロイメント[°]注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
12	点滴静注	ソルテ [°] M3A 輸液500mL 療法名:後)シス [°] ラチン+ト [°] セタキセル 肺癌【 [°] ロイメント [°] 注】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
05	ト [°] セタキセルの30分前に投与。