

## 第二外科

レジメン名称：CBDCA + DTX療法 2外科

レジメン説明：2015移行により生成  
 2017/8/23 DOC「EE」へ  
 2020/06/30 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	60mg/m2		63mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名：CBDCA + DTX療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 3.5時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1							
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：CBDCA + DTX療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	デキサート注射液(デキサトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：CBDCA + DTX療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL		投与順 3							
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバック 療法名：CBDCA + DTX療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4							
05	点滴静注  <次ページあり>	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名：CBDCA + DTX療法 2外科	0mg 250mL		投与順 5							

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CBDCA + DTX療法 2外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ