

第二外科

レジメン名称 : ネパ`ラチン+DOC療法

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ト`セタキセル点滴静注「EE」※	60mg/m2		63mg/m2
04	点滴静注	(化)アク`ラ静注用※	100mg/m2		105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトハ`ック`「テルモ」 療法名:ネパ`ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	アロキ`ン静注0.75mg 5mL デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名:ネパ`ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ト`セタキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL プ`ラボ`トル 療法名:ネパ`ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アク`ラ静注用※ 生理食塩液 500mL ソフトハ`ック`「テルモ」 療法名:ネパ`ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						
05	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトハ`ック`「テルモ」 療法名:ネパ`ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で	500mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 袈^ろ^ろラチン+DOC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:袈 ^ろ ^ろ ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 6						
07	点滴静注	デキサト注射液(デ ^カ ド ^ロ ン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:袈 ^ろ ^ろ ラチン+DOC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL			投与順 1	投与順 1	投与順 1			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ