

第二外科

レジメン名称 : DOC+Ram

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※	10mg/kg		10.5mg/kg
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	60mg/m2		63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:DOC+Ram 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] 後発)※ ホ [®] ラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボ [®] トル 療法名:DOC+Ram 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名:DOC+Ram 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボ [®] トル 療法名:DOC+Ram 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : DOC+Ram

RP	オーダーコメント
	全量250mL