

第二外科

レジメン名称：Tri-weekly docetaxel 2外科

レジメン説明：2015移行により生成
2017/8/23 DOC「EE」へ

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	60mg/m2		62mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Tri-weekly docetaxel 2外科 点滴静注: *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL テキアト注射液(テカト)後発)※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Tri-weekly docetaxel 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 50mL		投与順 2							
03	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:Tri-weekly docetaxel 2外科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3							

RP	オーダーコメント
01	キープ