

## 第二外科

レジメン名称 : 後)GEM+CDDP 【プロイムド注】

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m <sup>2</sup>		1100mg/m <sup>2</sup>
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m <sup>2</sup>		85mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラホトル 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 9時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイムド 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキシ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注:	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

## 第二外科

## レジメン名称 : 後)GEM+CDDP 【プロイムド注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「キルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7						
08	点滴静注	20%マニトール注射液「YD」 300mL 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
09	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)GEM+CDDP 【プロイムド注】 点滴静注: *点滴時間 0時間で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL			1回	1回	1回			
12	点滴静注 <次ページあり>	ソルテム3A 輸液500mL	500mL			2回	2回				







インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)GEM+CDDP 【フ°ロイソド注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
14	点滴静注	テ`キアト注射液(テ`カト`ロソ後発)※ グ`ラセト`ロソ静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)GEM+CDDP 【フ°ロイソド注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートをキープ
05	ジ`ェムサ`ールの30分前に投与。
13	ルートをキープ