

共通

レジメン名称 : 後) CDDP+GEM+アバスタン【プロイメント注】

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)ゲムシタピン点滴静注用「ヤルト」※	1250mg/m <sup>2</sup>		1312.5mg/m <sup>2</sup>
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m <sup>2</sup>		84mg/m <sup>2</sup>
08	点滴静注	(化)アバスタン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 後) CDDP+GEM+アバスタン【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 5.5時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名: 後) CDDP+GEM+アバスタン【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名: 後) CDDP+GEM+アバスタン【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイメント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CDDP+GEM+アバスタン【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CDDP+GEM+アバスタン【プロイメント注】	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										









共通

レジメン名称 : 後)CDDP+GEM+アバスタチン【プロイメント注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		投与経路:末梢ルートメイン1									
14	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CDDP+GEM+アバスタチン【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
15	点滴静注	デキスト注射液(デキストロン後発)※ グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CDDP+GEM+アバスタチン【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
	CDDP終了時、残破棄
05	ジェムサールの30分前に投与。 調製後3時間以内に投与終了すること。
08	初回のみ90分、次回から60~90分で。
09	アバスタチンと同時に開始