

第二外科

レジメン名称 : monthly CBDCA + GEM 2外科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/06/30 Day1にプロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:monthly CBDCA + GEM 2外科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + GEM 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキ静注0.75mg 5mL デキサート注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + GEM 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + GEM 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:monthly CBDCA + GEM 2外科 点滴静注:	0mg 500mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : monthly CBDCA + GEM 2外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
06	ルートキープ