

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 後) CBDCA+GEM+アハ[®]スチン

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)カボ [®] プラチン点滴静注液「サト [®] 」※	0mg		1000mg
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
05	点滴静注	(化)アハ [®] スチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテ [®] ム3A 輸液500mL 療法名: 後) CBDCA+GEM+アハ [®] スチン 点滴静注: *点滴時間 3.5時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	テキサト注射液(テカト [®] 後発)※ アロキシ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CBDCA+GEM+アハ [®] スチン 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)カボ [®] プラチン点滴静注液「サト [®] 」※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名: 後) CBDCA+GEM+アハ [®] スチン 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CBDCA+GEM+アハ [®] スチン 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)アハ [®] スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CBDCA+GEM+アハ [®] スチン 点滴静注:	0mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

共通

レジメン名称：後)CBDCA+GEM+アハ^スチン

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	ソルテ ^ム 3A 輸液500mL 療法名：後)CBDCA+GEM+アハ ^ス チン 点滴静注： *点滴時間 3.5時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサ ^ト 注射液(デカ ^ト ン後発)※ アロキ ^ン 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)CBDCA+GEM+アハ ^ス チン 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL								
03	点滴静注	(化)カルボ ^プ ラチン点滴静注液「サト ^ト 」※ 生理食塩液 250mL プラボ ^{トル} 療法名：後)CBDCA+GEM+アハ ^ス チン 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL								
04	点滴静注	(化)ゲムタ ^ビ ン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)CBDCA+GEM+アハ ^ス チン 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
05	点滴静注	(化)アハ ^ス チン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)CBDCA+GEM+アハ ^ス チン 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 100mL								
06	点滴静注	デキサ ^ト 注射液(デカ ^ト ン後発)※ グレネ ^ト ン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)CBDCA+GEM+アハ ^ス チン 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	6.6mg 3mg 100mL		投与順 2						

共通

レジメン名称 : 後)CBDCA+GEM+アバスタ

RP	オーダーコメント
01	キープ
02	シムサールの投与前
04	GEM→CBDCAの順
05	初回のみ90分、次回から60～90分で。