

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 3

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)monthly CDDP+PTX 【プロイメント注】

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	180mg/m2		190mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		85mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プロホトル 療法名:後)monthly CDDP+PTX 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 13時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ルルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)monthly CDDP+PTX 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ルルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後)monthly CDDP+PTX 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイメント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)monthly CDDP+PTX 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキサート注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL アロキシ静注0.75mg 5mL	9.9mg 1A 1A 0.75mg		投与順 5						
	<次ページあり>										

## 第二外科

## レジメン名称：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	100mL								
06	点滴静注	(化)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： *点滴時間 3時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルｺ」※ 生理食塩液 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ「テルモ」 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： *点滴時間 3時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7						
08	点滴静注	20%ﾏﾝﾆﾄﾞｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
09	点滴静注	ｼﾙﾃﾞ A1 輸液500mL K C L 注20mEqｷｯﾄ「テルモ」 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 9						
10	点滴静注	ｼﾙﾃﾞ A1 輸液500mL K C L 注20mEqｷｯﾄ「テルモ」 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄﾞ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)monthly CDDP+PTX 【ﾌﾟﾛｲﾈﾝﾄﾞ注】 点滴静注： <次ページあり>	8.25mg 100mL			1回	1回	1回			

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 3

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)monthly CDDP+PTX 【ポイント注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
12	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)monthly CDDP+PTX 【ポイント注】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
05	パクリタセルの30分前に投与。 調製後3時間以内に投与終了すること。