

第二外科

レジメン名称：monthly CBDCA + PTX療法

レジメン説明：2015移行により生成
 2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更
 2020/06/30 プロイメント追加

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	200mg/m ²		210mg/m ²
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:monthly CBDCA + PTX療法 点滴静注: *点滴時間 5.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1							
02	点滴静注	プロイメント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + PTX療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ガスター注射液20mg 2mL ホラミン注 5mg 1ml アロキシ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + PTX療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 1A 1A 0.75mg 100mL		投与順 3							
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:monthly CBDCA + PTX療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4							
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		投与順 5							

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : monthly CBDCA + PTX療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:monthly CBDCA + PTX療法 点滴静注: *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢サブルート1	250mL								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	パクリタセル投与前に
04	0.22μm以下のフィルター使用