

第二外科

レジメン名称： S-1+CDDP 【イメド[®]内服】 2外

レジメン説明： 2015移行により生成

適用条件： <S-1>

★80mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★Day1~21

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m ²		65mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4				
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名：S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注： *点滴時間 8時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1							
02	点滴静注	ソルテ [®] Δ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名：S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2							
03	点滴静注	ソルテ [®] Δ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名：S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3							
04	点滴静注	デキサ [®] 注射液(デカ [®] ロ [®] 後発)※ アロキ [®] 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 4							
05	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ック [®] 「テルモ」 療法名：S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外	0mg 300mL		投与順 5							
	<次ページあり>											

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : S-1+CDDP 【イメド[®]内服】 2外

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 6						
07	点滴静注	ソルテ [®] Δ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 7						
08	点滴静注	ソルテ [®] Δ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 8						
09	点滴静注	テ [®] キート注射液(テ [®] カト [®] ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL			1回	1回	1回			
10	点滴静注	ソルテ [®] Δ3A 輸液500mL 療法名:S-1+CDDP 【イメド [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	CDDPの投与前30分