

第二外科

レジメン名称：S-1 + CBDCA 2外

レジメン説明：2015移行により生成
2020/06/30 プロイメンド追加、デキサート半量に変更

適用条件：<S-1>
★80mg/m²/日を1日2回に分けて服用
★Day1~14

除外条件：
体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184
AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)
使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)カボ [®] プラチン点滴静注液「サト [®] 」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	リルテ [®] Δ3A 輸液500mL 療法名:S-1 + CBDCA 2外 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメ [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1 + CBDCA 2外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキ [®] 静注0.75mg 5mL デキサート注射液(テ [®] カ [®] ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1 + CBDCA 2外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)カボ [®] プラチン点滴静注液「サト [®] 」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:S-1 + CBDCA 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ