

第二外科

レジメン名称 : 後) VNR+CDDP

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)パベルシオン注※	25mg/m2		26.25mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 9時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	カルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名: 後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	カルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名: 後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) VNR+CDDP 点滴静注:	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

第二外科

レジメン名称 : 後) VNR+CDDP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)ナバル [®] 注※ 生理食塩液 50mL プラボ [®] トル 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ッグ「テルモ」 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7						
08	点滴静注	20%マンニト [®] ール注射液「YD」 300mL 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
09	点滴静注	ソルテ [®] ム1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルテ [®] ム1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	デキ [®] サート注射液(デカ [®] モン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL			1回	1回	1回			
12	点滴静注 <次ページあり>	ソルテ [®] ム3A 輸液500mL	500mL			2回	2回				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後) VNR+CDDP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
14	点滴静注	グラネセトン点滴静注 ^{ハッ} 3mg/100mL「NK」 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg		投与順 2						
15	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:後) VNR+CDDP 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
13	ルートキープ