

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/06/30 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/m2		105mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※	0mg		900mg
06	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサート注射液(デキサトロン後発)※ アブキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV	0mg 500mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL								
02	点滴静注	プロイマント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	デキサト注射液(テカトロン後発)※ アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL								
04	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL								
06	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV	100mL		投与順 1						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL								
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	デキサト注射液(テカトロン後発)※ アロキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL								
04	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL								
06	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV	100mL		投与順 1						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
08	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CBDCA + Weekly アブラキサン + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	フィルターを通さないこと
06	忍容性良ければ2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
07	ルートキープ