

インターバル日数 : 0 日 基準日 : Day 1

レジメン名称 : アバスチン単品(15mg/kg) NSCLC 2外

共通

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)アバスチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アバスチン単品(15mg/kg) NSCLC 2外 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		12:00						
02	点滴静注	(化)アバスチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アバスチン単品(15mg/kg) NSCLC 2外 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	初回のみ90分、次回から60~90分で投与。