

第二外科

レジメン名称：後)CDDP動注療法 2外科

レジメン説明：2015移行により生成

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	抗癌剤持続動注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	100mg		100mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3					
01	点滴静注	ソルテムΔ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名：後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	500mL 10mL		投与順 1							
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 3							
04	抗癌剤持続動注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 療法名：後)CDDP動注療法 2外科 抗癌剤動脈内持続注入： *点滴時間 2時間で 投与経路：A (動注) ポート	0mg		投与順 4							
05	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名：後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢ルートメイン1	300mL		投与順 5							
06	点滴静注 <次ページあり>	ラクテック注 500mL ソフトバッグ	500mL		投与順 6							

第二外科

レジメン名称 : 後)CDDP動注療法 2外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		療法名:後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
07	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 10mL		投与順 7						
08	点滴静注	テキサー注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	8.25mg 100mL			投与順 1	投与順 1				
09	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CDDP動注療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回					