

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+CDDP+PEM

レジメン説明 : 2019/12/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
07	点滴静注	(化)アムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
09	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		78.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										



インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

## 第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+CDDP+PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
12	点滴静注	デキサト注射液(7 <sup>ナ</sup> カ <sup>ト</sup> ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL			投与順 1	投与順 1	投与順 1			
13	点滴静注	ソルテ <sup>ム</sup> 3A 輸液500mL 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 2	投与順 2				
14	点滴静注	ソルテ <sup>ム</sup> 3A 輸液500mL 療法名:Atezolizumab+CDDP+PEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 3	投与順 3				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	血管痛発現時は60分に延長可
06	0.2又は0.22 $\mu$ mのフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降は30分に短縮可