

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+PEM

レジメン説明 : 2019/12/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
05	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイマット点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキ静注0.75mg 5mL デキサート注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+PEM 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL	1200mg	投与順 4						
05	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+PEM 点滴静注:	0mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)カボ [®] プ [®] ラチン点滴静注液「サト [®] 」※ 生理食塩液 250mL プ [®] ラボ [®] トル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+PEM 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	血管痛発現時は60分に延長可
04	0.2又は0.22 μ mのフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降は30分に短縮可