

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二外)

レジメン説明 : 2019/1/28 レジメン承認
 2019/5/28 テキサト 16.5mg→9.9mgへ (アプレキト必ず併用のため)
 2019/6/10 PTX175mg/m2→200mg/m2へ (レジメン委員会承認)
 2019/9/26 サントック→カスターへ変更
 2020/06/27 プロイメント追加

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
05	点滴静注	(化)アプレキト点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg
06	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	200mg/m2		210mg/m2
07	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二 点滴静注: *点滴時間 7.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	ホラミン注 5mg 1mL カスター注射液20mg 2mL テキサト注射液(テキサトロン後発)※ アプレキト静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 20mg 9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注 <次ページあり>	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二	0mg 250mL		投与順 4						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二外)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1									
05	点滴静注	(化)ア ^テ ズチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 5						
06	点滴静注	(化)パ ^ク リタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバ ^ッ ク 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)カル ^ボ プラチン点滴静注液「サ ^ト 」※ 生理食塩液 250mL ソフトバ ^ッ ク 療法名:Atezolizumab+PTX+CBDCA+Bevacizumab(二 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 7						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22 μ mのフィルター使用 忍容性がよければ2回目以降30分に短縮可
05	フィルター使用可 忍容性が良ければ、2回目60分、3回目以降30分に短縮可
06	0.22 μ m以下のフィルター使用