

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Atezolizumab+Bevacizumab維持療法(二外)

レジメン説明 : 2019/1/28 Atezo+Bev+PTX+CBDCAレジメン承認  
2019/7/23 承認

適用条件 :  
除外条件 :  
体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184  
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
03	点滴静注	(化)アハ`スチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラホ`トル 療法名:Atezolizumab+Bevacizumab維持療法(二外) 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL プラホ`トル 療法名:Atezolizumab+Bevacizumab維持療法(二外) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アハ`スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+Bevacizumab維持療法(二外) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22µmのフィルター使用 忍容性がよければ2回目以降30分に短縮可
03	フィルター使用可 忍容性が良ければ、2回目60分、3回目以降30分に短縮可