

第二外科 【ICI単剤】 レジメン名称 : Durvalumab 二外

レジメン説明 : 2018/7/20承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)イミフィンジ [®] 点滴静注※	10mg/kg		10.5mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Durvalumab 二外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)イミフィンジ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Durvalumab 二外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22 μmのフィルター使用 終濃度 : 1~15mg/mL